


доклад о суслике 2 класс



Загрузок: 2867 Скорость: 1.43 Мб/с

СКАЧАТЬ

Рейтинг: ★★★★★
Автор: Clopper

Безопасно! Вирусов нет

В ❤️ 196 Нравится 100 Твитнуть +1 50 95

161 комментарий В



Саша
Благодарочка за все!
1 минуту назад



Ангелина
Побольше бы таких сайтов.
1 минуту назад



Гриша
Первый раз тут, скорость загрузки радует, наличие файлов тоже!
1 минуту назад



Марина
Всем советую, качает быстро.
1 минуту назад



Леша
не поверил глазам, есть все. спасибо!
1 минуту назад



Оксана
Глупости говорят, что незаменимых не бывает, без этого сайта я бы пропала.
1 минуту назад

Границы степей постоянно меняются в зависимости от количества осадков. В засушливые годы степи могут превращаться в пустыни, а в дождливые степь вновь возвращается к старым границам. Длительное использование степей под пастбища и сельскохозяйственные угодья привело к обеднению флоры и фауны этой экосистемы, и теперь многие виды степных животных можно встретить только в заповедниках. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Наблюдать за поведением этого грызуна в дикой природе - занятие чрезвычайно увлекательное. Суслики - весьма осторожны. Выбираясь днем из норы, он становится на две лапки и осматривается по сторонам. Если вблизи он не заподозрит ничего опасного, тогда вся колония сусликов начинает выбираться из своих подземных убежищ и заниматься обычными дневными заботами - они играют, собирают корм и очень любят поточить свои острые зубки. Суслики относятся к роду некрупных грызунов семейства беличьих. Это самые многочисленнные обитатели степей, суслик желтый при этом является еще и самым крупным представителем вида. Внешний вид. Тело у суслика длиной 23-38 см. Вес взрослого зверька после зимней спячки - 600-900 г, а перед залеганием в спячку - 1-1,6 кг. Хвост длиной 6,4-12 см (примерно 35% от длины тела). Развитость защечных мешков слабая. Окрашен типичный житель степей суслик однотонно. Биология длинхвостого суслика Фото автора Суслики - животные класса млекопитающих, отряда грызунов, рода беличьих. На территории бывшего СССР обитает 12 видов. Длиннохвостые суслики распространены на Восточном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау, в Средней и Западной Монголии, на юге Средней Сибири, Алтае, по горам Забайкалья, на севере Большого Хингана и в Центральной Якутии. Длиннохвостый суслик - это сравнительно крупный зверёк с длинным и пушистым хвостом. Экологическая проблема - это не просто проблема загрязнения среды и другие отрицательные влияния хозяйственной деятельности человека на Земле. «Она вырастает в проблему преобразования стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целеустремленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею». Такое взаимодействие осуществимо. Но его основа - развитый в каждом человеке уровень экологического сознания, экологической культуры. В роде сусликов 38 видов, из них в России 9 видов. Наиболее обычны: крапчатый суслик, малый суслик, жёлтый суслик и длиннохвостый суслик. • Тропический суслик • Алашанский суслик • Кольцехвостый суслик • Уинтский суслик • Черноголовый суслик • Калифорнийский суслик • Суслик Белдинга • Айдахский суслик • Суслик Мерриам • Европейский суслик • Колумбийский суслик • Даурский суслик • Вайомингский суслик • Краснощёкий суслик • Суслик Франклина • Жёлтый суслик • Золотистый суслик... Суслики - лат. Citellus, род грызунов из семейства беличьих, размеры которых колеблются в пределах от 20 см до 40 см. Основная часть видов сусликов населяют степные, лесостепные и лугостепные районы. Имеют широкое распространение на территории Европы. Сейчас насчитывается 3 подрода с 20 видами. - Суслик американский длиннохвостый (citellus parryi Richardson) - Длина тела до 33 см, длина хвоста до 14 см. - Суслик азиатский длиннохвостый или суслик Эверсмана (Citellus undulatus Pallas).